




# GROUPEZ LES VÊLAGES

**M**aitriser la période et l'étalement de la reproduction : la fin des vêlages ne doit pas chevaucher le début de la reproduction ; pour gagner en organisation de son travail.

Grouper les vêlages permet des gains multiples : lots homogènes simplifiant l'alimentation, gérer en commun des suivis sanitaires (vaccins...), réduire ou mieux prévoir les concurrences avec les autres ateliers de l'exploitation, dégager de la disponibilité.

L'organisation de l'ensemble du travail de l'année se décide à partir de la période de reproduction.



## Témoignage de Jean-Noël AUVINET et Christophe BAUDOIN, GAEC Les Rivages (Deux-Sèvres)

Le GAEC Les Rivages réalise 90 vêlages charolais sur deux périodes : en septembre-octobre, et 3 mois à partir de mi-janvier. « *Nous avons choisi deux périodes pour mieux valoriser notre ressource fourragère très sensible aux sécheresses dans nos coteaux* ». L'exploitation est en agriculture biologique, et toutes les femelles sont finies. Le troupeau est conduit en monte naturelle pour les vaches et en IA sur les génisses.

« *Pour optimiser la productivité, nous faciliter le travail et libérer du temps, nous avons limité la période de reproduction et réalisé les vêlages en dehors des travaux des champs. En période de vêlages, il me faut être là* », précise Jean-Noël « *avec l'appui de Christophe au besoin. Idem pour la reproduction, je sais qu'il faut être vigilant, je note les chaleurs, les saillies et les retours. Comme la période est courte, je peux y consacrer le temps nécessaire tôt le matin et tard le soir. Je fais plus attention à l'alimentation et aux taureaux sur cette période ; ensuite c'est la tranquillité, on est libéré.* »

L'IVV est proche des 365 jours. « *Une vache se décalant est réformée* », rajoute Christophe « *notre repère c'est l'intervalle vêlage saillie fécondante, une vache dépassant les 100 jours est dans le rouge si elle a vêlé en fin de période. Cette sélection nous permet de garder les vaches les plus fertiles et aujourd'hui, notre taux de renouvellement de 25 % n'est pas plus élevé que nos voisins* ». Avec une gémellarité de 5-6 % et une mortalité de 6-7 %, ils sèvrant 0,96 à 1 veau par vache.

Les vaches en vêlage d'automne sont échographiées avant la mise à l'herbe et celles du printemps au retour du pâturage. « *Cela nous permet de trier les vaches en finition et d'écourter le délai dernier vêlage-vente* » ■



### Leviers d'action :

Conduite du troupeau.

Organisation  
calendaire du  
troupeau.



### Objectifs :

- +++ Être plus efficace.
- + Se libérer du temps.
- ++ Améliorer la productivité.



### Contraintes de mise en œuvre :

Forte astreinte en période de vêlage.

Un poids suffisant des génisses à la saillie.

Éliminer les vaches se décalant.

Augmenter le nombre de génisses à la saillie.



## Intérêts • Limites

Concentrer les tâches pour mieux s'organiser, au lieu de tout faire en même temps.

Se libérer du temps pour les autres ateliers.

Optimiser l'alimentation grâce à des lots homogènes.

Limiter les animaux improductifs :

- IVV proche de 365 jours
- une mortalité inférieure (2,5 à 4 points de moins)
- 20 kg vif de plus à 210 jours (source : Bovins Croissance, Pays de la Loire / Deux-Sèvres).

Faire preuve de plus de rigueur, anticiper et préparer les événements.

La mise en œuvre du groupage des vêlages implique au départ de retarder la mise en reproduction des vaches ayant vêlés en début de période.



## Conditions de réussite

Une disponibilité importante pour surveiller au moment de la reproduction par IA et des vêlages. Elle se fera en dehors des périodes des travaux de saison.

S'assurer d'un bon élevage des génisses pour atteindre 70 % de poids adulte à la mise à la reproduction. Cibler un vêlage des génisses en début de période (pour ne pas les réformer en cas de décalage).

Une alimentation soutenue pour les primipares (recommandé de les séparer des vaches) et les vaches en reproduction augmente la fertilité des animaux.

Un vêlage sans aide et une délivrance rapide facilite le retour de la fertilité.



## Conseils des éleveurs

Se fixer une date début et fin avec le taureau.

Noter les chaleurs, les saillies et les retours. Surveiller tôt le matin et tard le soir.

Faire un diagnostic de gestation 1 à 2 mois après la fin de la période de reproduction.

Étaler sa trésorerie avec 2 périodes de vêlages.

Réduire l'âge au premier vêlage à 30 mois avec 2 périodes.



## Conseils du technicien

La période idéale n'existe pas, l'objectif est de concentrer les tâches et de faire en sorte que le dernier vêlage ne chevauche pas le début de la reproduction.

Cette période est choisie selon :

- les capacités des bâtiments (vêlage au champ si pas suffisamment de cases de vêlage)
- la qualité des stocks fourragers (enrubannage pour les vêlages de début d'hiver),
- le mode de reproduction.

Regrouper la reproduction permet de sélectionner les vaches les plus fertiles.

Optimiser la saillie avec 1 taureau pour 25 vaches.

Prévoir un taureau d'avance en cas de problème.



[www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr](http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr)  
[www.deux-sevres.chambre-agriculture.fr](http://www.deux-sevres.chambre-agriculture.fr)

